

Melitinide®
Liraglutide
r-DNA origin
Pen-Injector; 18 mg / 3 ml

داروی ملیتاید® چیست؟

هر قلم تزریقی داروی ملیتاید® حاوی ۱۸ میلی‌گرم (۶ میلی‌گرم در هر میلی‌لیتر) لیراگلویتاید به شکل محلول بی‌رنگ، بدون کدورت و بدون ذره است و در بسته‌بندی‌های تک عددی به همراه برگه راهنمای بیمار و سرسوزن عرضه می‌شود.

موارد مصرف

پایین آوردن قند خون (گلوکز) در بیماران بالای ۱۰ سال مبتلا به دیابت نوع ۲



پایین آوردن ریسک وقایع قلبی-عروقی مانند سکته قلبی، سکته مغزی و مرگ در بزرگسالان مبتلا به دیابت نوع ۲ و بیماری قلبی-عروقی



کاهش وزن در افراد بالای ۱۲ سال، در صورتی که:
۱- شاخص توده بدن (BMI) فرد بزرگتر یا مساوی ۳۰ باشد.
۲- شاخص توده بدن (BMI) فرد بین ۲۷ و ۳۰ باشد و فرد مبتلا به یک بیماری زمینه‌ای دیگر مانند دیابت، فشار خون بالا یا چربی خون بالا باشد.



دوز و نحوه مصرف

مقدار مصرف هر دارو را پزشک تعیین می‌نماید.



دوز توصیه شده برای تزریق این دارو جهت کنترل قند خون در افراد مبتلا به دیابت نوع ۲:
دوز شروع ۰/۶ میلی‌گرم یکبار در روز برای حداقل یک هفته می‌باشد، مقدار مصرف با تجویز پزشک می‌تواند تا ۱/۸ میلی‌گرم یکبار در روز افزایش یابد.



دوز توصیه شده برای تزریق این دارو جهت مدیریت اضافه وزن
مزمون:

در ابتدا، تزریق با دوز ۰/۶ میلی‌گرم یکبار در روز به مدت یک هفته آغاز شده، سپس دوز با فواصل هفتگی (یا بیشتر، بسته به نظر پزشک) به میزان ۰/۶ میلی‌گرم افزایش می‌یابد تا به مقدار ۳ میلی‌گرم یکبار در روز برسد.



ملیتاید[®] به صورت زیرجلدی در نواحی شکم، روی ران و بالای بازو تزریق می‌شود.



شرایط نگهداری

ملیتاید[®] باید در دمای ۲-۸ درجه سانتی‌گراد (در یخچال) نگهداری و از یخ‌زدگی محافظت شود.

